

アメナリーフ[®]錠200mg

再発性の単純ヘルペス
(口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス)に対する
PIT[※]を受けられる方へ

※Patient Initiated Therapy : あらかじめ処方された薬剤を初期症状に基づき患者判断で服用開始する治療方法

アメナリーフ[®]錠200mg

再発性の単純ヘルペス(口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス)に対する PITを受けられる方へ

PIT(Patient Initiated Therapy)は、あらかじめ処方されたお薬を、初期症状(ピリピリ、チクチクといった違和感)が出たときに患者さん自身の判断ですぐに服用する治療法です。

お薬をもらってから服用するまでの流れ

- ・痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
- ・むずむずするような違和感
- ・かゆみ
- ・腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)



お薬を服用したあとは、次回の再発に備えて早めに医療機関を受診してください。



6錠を1回で



本説明書の内容は、Web サイトでも確認できます



お薬の服用方法

- 6錠を1回、食後に服用します。
- 再発の初期症状を感じた場合、できるだけ速やか(6時間以内)に服用してください。
- 口唇ヘルペスでは、水ぶくれができる前に服用してください。
- 空腹時はお薬が吸収されにくいいため、食後に服用してください。食前または食間に服用する場合は、軽食等何か食べた後(30分以内)に服用してください。
- 服用前後はグレープフルーツジュース(果実自体を含む)を摂取しないでください。お薬の血中濃度が上昇するおそれがあります。
- 初期症状を感じてから6時間以上経過してしまった、口唇ヘルペスで水ぶくれができてしまった場合は、医療機関に相談してください。



保管に関するチェック項目

- できるだけ速やかに服用するために、お薬をケース等に入れて携帯してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

服用前のチェック項目

下記のいずれかに当てはまる方は、お薬を服用せずに医療機関を受診してください。

- アレルギーの既往歴のある方
- 口唇ヘルペスまたは性器ヘルペスの再発時に他の病気でお薬を服用中の方
- 妊婦または妊娠している可能性のある女性、授乳中の女性

アメナリーフは、ウイルスが増えるのを抑えるお薬であるため、効果があらわれるまで少し日数がかかることがあります。

服用後に下記のような症状があらわれた場合は、
すぐに医療機関を受診してください。

- 円形または楕円形の赤い発疹
- 発熱
- 関節の痛み

服用後に下記のような症状があらわれた場合は、
医師または薬剤師に相談してください。

- (患部とは別に) 広範囲の発疹(ブツブツや斑点)
- 蕁麻疹やかゆみ
- お薬を飲んでから継続する下痢
- 胃の痛みや不快感、吐き気、嘔吐などの症状
- 歯茎の腫れや出血、膿などの症状
- 色の見え方が普段と異なるなどの眼の症状

その他、わからないこと、何か気になることがあれば、
医師または薬剤師に相談してください。

